第二届江苏省高校后勤系统
园林绿化职业技能竞赛理论题库及答案

题库内容：单项选择题350题，多选题70题，判断题280题

一、单项选择题(第1题～第350题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。)

1.下列关于植物种群的叙述中错误的是（ ）。

A、凡是占据某一特定地区某一个种的一群个体称为种群

B、种群是某一个种的个体总和，也有自己的特征、结构与功能

C、种群可以适应环境也可以改变环境

D、江苏山区的马尾松群和浙江山区的马尾松群都是属于同一个马尾松种群

2.保存蜡封接穗的适宜温度是（ ）。

A、—5～10℃

B、0～5℃

C、5～10℃

D、10～15℃

3.植物吸水的主要器官是（ ）。

A、根

B、叶

C、茎

D、花

4.下列关于植物开花的叙述中错误的是（ ）。

A、植物完成春化作用仅有低温是不够的，还需要氧气、水分和糖类

B、植物完成春化作用感受低温的主要部位是茎尖生长点

C、光周期中对植物生长其作用的是暗期

D、短日照植物要求经历黑夜时期短于一定长度才能开花，缩短暗期有利于开花

5.下列花卉中用于林下或林缘线下种植的是（ ）。

A、月季

B、半枝莲

C、鸡冠花

D、玉簪

6.下列植物矿物质营养中不属于微量元素的是（ ）。

A、铜

B、氮

C、锌

D、硼

7.下列关于影响根部吸收矿物质元素的条件的叙述中不正确的是（ ）。

A、在一定范围内，根系吸收矿物质元素随土壤温度升高而增加

B、土壤溶液碱性增强时，能增强各种金属离子溶解度，有利于植物吸收

C、温度过高或过低都会使根系对矿物质元素的吸收减缓

D、温度会影响酶的活性、膜的透性，从而间接影响矿物质元素的吸收与运输

8.下列关于植物蒸腾作用的叙述中错误的是（ ）。

A、气孔运动影响蒸腾作用

B、光照是影响蒸腾作用的最主要的外界条件

C、温度升高到一定程度时反而会使蒸腾强度下降

D、光照越强，蒸腾作用越强

9.勿忘我作为切花栽培，多做（ ）栽培。

A、多年生

B、球根

C、一二年生

D、水生

10.栽植坑形状应是（ ）。

A、花盆状

B、筒状上下一致

C、上大下小

D、方形

11.要求繁殖苗一级成品率不低于（ ）。

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

12.农谚“锄头底下有水”是指（ ）。

A、翻地时挖到了地下水层

B、翻耕的对象土壤是有水分的

C、中耕能切断上下毛管联系，阻碍水汽蒸发，从而防止了水分的损失

D、一种农具，具有连带浇水功能

13.在城市园林绿化中，经常把木制格栅或铁制格栅压在行道树土面上，这其中主要目的是（ ）。

A、美观

B、保护土壤通透性

C、增加土壤保温性

D、防止草类生长

14.病部出现锈黄色粉状病症，一般为（ ）。

A、白粉病

B、锈病

C、病毒病

D、线虫病

15.斜纹夜蛾属鳞翅目夜蛾科，为害的阶段主要是（ ）。

A、卵

B、幼虫

C、蛹

D、成虫

16.改善土壤保肥性和供肥性的重要措施是（ ）。

A、增施化肥

B、增施有机肥

C、增施 ca,mg 等间接肥料

D、增施微量元素肥

17.（ ）土壤易出现漏肥。

A、砂土

B、壤土

C、黏土

18.（ ）能有效促进团粒结构的形成。

A、施用硫磺粉

B、施用保墒剂

C、施用聚丙烯晴

D、施用河砂

20.一旦表层土壤形成干土层，土壤水分蒸发损失（ ）。

A、仍然比较多
B、比较少
C、决定于土壤有机质的含量
D、比较稳定、变化慢
21.有机质含量比较高的土壤（ ）。
A、温度比较容易升高
B、温度比较容易降低
C、与温度的变化无关
D、比较稳定、变化慢
22.幼虫期和成虫期对农药都比较敏感，尤其在（ ）阶段抗性最弱。
A、一龄幼虫
B、二龄幼虫
C、三龄幼虫
D、成虫
23.白粉病类由（ ）中的白粉菌引起。
A、真菌
B、细菌
C、病毒
D、线虫
24.下列对宅间绿地叙述不正确的是（ ）。
A、面积小而零散的地块
B、宅间绿地的宽度一般在 20～25 米
C、一般以植物造景为主
D、一般乔木的种植点远离建筑 5 米以外
25.下列产物中，由光合作用直接产生的是（ ）。
A、葡萄糖
B、核酸
C、生长素
D、花色素
26.植物多样性原理在园林植物配置中不应体现在（ ）。
A、园林植物群落应有一定的物种组成，避免单一
B、园林植物群落应有一定的层次结构
C、园林植物群落应有一定的年龄结构

D、提倡大量使用大树、古树，以更好发挥生态效用

27.下列肥料不能混合的是（ ）。

A、硫酸钾与过磷酸钙

B、磷酸铵与尿素

C、氯化铵与堆肥

D、草本灰与硫酸铵

28.由真菌中的白粉病引起的病，一般不会发生在（ ）。

A、叶片

B、幼果

C、嫩枝

D、根

29.关于樱花细菌性根癌病的叙述，下列不正确的是（ ）。

A、发生在根上

B、初期产生黑褐色的瘤状物

C、瘤状物会变硬

D、瘤状物体积会增大

30.对蜗牛形态描述不正确的是（ ）。

A、一对触角

B、眼在触角顶端

C、腹足的肌肉发达

D、能够分泌黏液

31.下列关于国槐尺蛾的描述，不正确的一项是（ ）。

A、寄主为槐树

B、地下害虫

C、老熟幼虫有吐丝下垂的习性

D、入土化蛹

32.香樟樟巢螟成虫在宜兴最早可以在（ ）出现。

A、4 月下旬 5 月上旬

B、5 月中下旬

C、6 月上旬

33.下列防止蜗牛的措施哪项是不正确的（ ）。

A、晴天人工捕捉

B、清晨人工捕捉

C、阴雨天人工捕捉

D、灭蜗灵

34.螨类一般由四个阶段构成的，成螨和若螨具足（ ）对。

A、1

B、2

C、3

D、4

35.杭州新胸蚜的寄主为（ ）。

A、香樟树

B、蚊母树

C、桂花树

D、桃树

36.做行道树的苗木，分枝点不得低于（ ）米。

A、1.5

B、2.0

C、2.8

D、3.5

37.柳蓝叶甲属鞘翅目叶甲科，成虫体长 4mm 左右，近圆形，（ ）。

A、白色

B、红色

C、蓝色

D、黄色

38.蔷薇三节叶蜂不为害（ ）等花卉。

A、菊花

B、月季.

C、黄刺玫

D、玫瑰

39.投影线依一定的投影方向平行的投射下来，用平行投影线做出的投影称为（ ）。

A、直投影

B、斜投影

C、正投影

D、平行投影

40.两个或多个点、线及平面的投影，重合在同一投影面上时，称为（ ）。

A、重影
B、正影
C、阴影
D、投影
41.A0 图纸的幅面尺寸大小应是（ ）。
A、800mmx1200mm
B、841mmx1189mm
C、841mmx1200mm
D、800mmx1189mm
42.裸根掘苗，一般落叶乔木根系幅度应为胸径的（ ）倍。
A、3—4
B、5—7
C、8—10
D、12—15
43.尺寸起止符号一般用中粗斜线绘画，其倾斜方向应与尺寸界限呈（ ）。
A、顺时针 45° 角
B、顺时针 35° 角
C、逆时针 45° 角
D、逆时针 35° 角
44.在轴测图中标注尺寸时，其起始符号宜用（ ）。
A、斜线
B、圆点
C、箭头
D、直线
45.下列不属于园林地形地貌作用的是（ ）。
A、改善种植条件和创造园林景观
B、满足园林功能的要求
C、满足经济的需要
D、满足园林绿地排水要求
46.反映实际地貌、地物的图一般称（ ）。
A、平面图
B、剖面图
C、地形图

D、效果图

47.用平面表示地面做出的图称（ ）。

A、平面图

B、剖面图

C、地形图

D、效果图

48.食叶害虫的危害表现为（ ）。

A、黄化

B、畦形

C、腐烂

D、缺刻或孔洞

49.图例线、索引符号、引出线、标高符号、较小图形的中心线一般采用（ ）。

A、粗实现

B、虚线

C、细实线

D、点画线

50.在下列植物中，（ ）地皮植物。

A、马蹄金

B、狗芽根

C、高羊茅

D、黑麦草

51.建筑平面图、立面图、剖面图中一般构建的轮廓线用（ ）。

A、粗实现

B、细实线

C、点画线

D、中实线

52.新建建筑物的不可见轮廓线一般用（ ）。

A、粗实现

B、粗虚线

C、细实线

D、点画线

53.分水线、中心线、对称线、定位轴线一般用（ ）。

A、细点画线

B、细虚线
C、细实线
D、细双点画线
54.下列树木中，不属于木兰科的是（ ）。
A、白玉兰
B、马褂木
C、乐昌含笑
D、桂花
55.下列树木中，不属于杨柳科的是（ ）。
A、垂柳
B、河柳
C、柽柳
D、钻天杨
56.重阳木属于（ ）。
A、蔷薇科
B、大戟科
C、豆科
D、五加科
57.下列树种与无患子为同一科的是（ ）。
A、龙爪槐
B、重阳木
C、香樟
D、黄山栾树
58.下列树木中与八角金盘为同一科的是（ ）。
A、中华常春藤
B、女贞
C、三角枫
D、棣棠
59.阿维菌素是（ ）药剂。
A、化学杀虫剂
B、生物杀菌剂
C、化学杀螨剂
D、抗生素杀螨剂

60.下列树木中，属于单叶的是（ ）。

A、风杨

B、迎春

C、香樟

D、重阳木

61.下列关于我国各大树木栽植适宜季节的叙述中，错误的是（ ）。

A、华南地区春栽应提早，秋栽应晚栽，可以冬栽

B、西南地区春季为雨季，最适宜树木栽植

C、长江流域地区，一般除夏季可按不同树种选择适宜的栽植期

D、华北大部分与西北南部一春栽为主

62.在附壁式、主柱式绿化施工中，种植槽内的土层厚度不得小于（ ）cm。

A、20

B、30

C、50

D、80

63.附壁式栽植时，苗木根部与壁面的距离应恰当，过近过远都不好，一般相距（ ）cm。

A、5---10

B、15---20

C、25---35

D、40---50

64.承载能力较小的屋顶绿化一般较宜选择（ ）。

A、棚架式

B、地毯式

C、自由式

D、庭院式

65.凌霄是借助（ ）攀援生长的。

A、吸盘

B、缠绕茎

C、气根

D、皮刺

66.能挖土球直径100cm的中型树木移植机，主要用于移植直径在（ ）的树木。

A、16---20cm以上

B、16---20cm 以下

C、10---12cm 以上

D、10---12cm 以下

67.下列不属于绿化工程的中间验收工序是（ ）。

A、整地验收

B、种植定点放线的验收

C、成活率验收

D、种植穴的验收

68.绿化工程竣工验收时，地被植物应在成活后郁闭度达到（ ）%时进行验收。

A、50

B、60

C、80

D、90

69.绿化工程竣工验收时，花坛一二年生花卉种植后应在（ ）后进行验收。

A、三天后

B、一周后

C、15 天

D、一个月后

72.对大树进行断根缩坨时，一般保留（ ）cm 以上的粗根，并对靠土球壁的粗根进行环状剥皮，剥皮宽度为（ ）cm。

A、0.5,5

B、1,10

C、1.5,15

D、2,20

73.杨树根癌病是（ ）侵染所致。

A、真菌

B、细菌

C、病毒

D、线虫

74.石榴生长期修建一般采用（ ）。

A、疏剪

B、轻短截

C、缩剪

D、重短截

75.下列树木中，不属于松科属的是（ ）。

A、马尾松

B、湿地松

C、白皮松

D、日本柳杉

76.下列树木中，不属于山茶科的是（ ）。

A、榔榆

B、山茶

C、茶树

D、日本厚皮香

77.下列树木中，不属于槭树科的是（ ）。

A、鸡爪槭

B、三角枫

C、红枫

D、黄山栾树

78.下列树木中，不适合做行道树的是（ ）。

A、棣棠

B、风杨

C、国槐

D、杜英

79.树木移植修剪，一般不剪的是（ ）。

A、青桐、臭椿

B、合欢、悬铃木

C、槐树、栾树

D、银杏、白蜡

80.草坪修剪的基本原则是（ ）原则。

A、及时

B、频繁

C、三分之一

D、五分之二

81.花粉壁中的识别蛋白是（ ）。

A、糖蛋白

B、色素蛋白

C、脂蛋白

D、核蛋白

82.下列哪项不是黄壤的基本特征（ ）。

A、粘

B、皎

C、瘦

D、磷素丰富

83.我国有关园林设计的专著与论述问世的甚多，最著名的当首推明代计成所著的（ ）。

A、《长物志》

B、《一家言》

C、《园志》

D、《红楼梦》

84.二月上旬至三月上旬为（ ）栽培最佳时期。

A、竹类

B、常绿树

C、落叶树

D、热带植物

85.盆景艺术是一门综合性的园林艺术，它的形成、发展的过程主要受到（ ）的影响。

A、盆栽技术

B、造园艺术

C、工艺

D、绘画艺术

86.下列哪种花卉属于秋播花卉（ ）。

A、三色堇

B、鸡冠花

C、千日红

D、百日草

87.微型盆景又称掌上盆景，其艺术要求很高，按照评比要求，规格一般是（ ）件。

A、7～9

B、3～15
C、2～4
D、8～10
88.花灌类植物有（ ）。
A、腊梅
B、葡萄
C、紫藤
D、凌霄
89.文竹常用的繁殖方法是（ ）。
A、播种、扦插
B、扦插、嫁接
C、播种、分株
D、压条、播种
90.地被植物类，覆盖地面的低矮植物有（ ）。
A、六月雪
B、铺地柏
C、茉莉
D、小叶女贞
91.按照土球包扎的要求，土球直径在（ ）厘米以上时，须在坑内包扎。
A、15
B、25
C、30
D、40
92.一面观赏的坡形花坛，应（ ）栽植。
A、由中心向外
B、由上而下
C、自下而上
D、从外向内
93.仙客来属于（ ）。
A、报春花
B、百合
C、桑
D、菊

94.真菌常表现的病症是（ ）。
A、坏死
B、黄化
C、菌脓
D、霉粉
95.蔷薇叶蜂的食性为（ ）。
A、腐食
B、植食
C、肉食
D、杂食
96.适量用药防治病虫害，是指（ ）。
A、适当的用药量
B、确定恰当的施药次数
C、适当的用药量和施药次数
D、用药量不受限制
97.山水盆景中重庆常用的软石材是（ ）。
A、吸水石
B、歌乐山石
C、鸡骨石
D、泡沙石
98.每天光照（ ）小时以上才能正常开花结果的植物叫长日照植物。
A、8 小时
B、10 小时
C、11 小时
D、12 小时
99.苗木生长后期追肥：（ ）。
A、尿素
B、硝酸铵
C、磷酸二氢钾
D、硫酸铵
100.黄杨绢野螟防治的关键时期是（ ）。
A、越冬代幼虫危害期
B、第一代幼虫危害期

C、第二代幼虫危害期

101.植物枝叶产生徒长，可能是由（ ）元素过量引起的。

A、磷

B、钾

C、氮

102.棕榈有不同于一般树种的特点是（ ）。

A、枝条很长

B、枝条簇生

C、枝条轮生

D、无枝条

103.对喜钾植物，在下列复合肥料中可优先选用（ ）。

A、磷酸铵

B、硝酸钾

C、磷酸二氢钾

D、铵磷钾复肥

104.在种植穴挖掘中，一般 150 厘米*80 厘米以上的穴由（ ）开挖。

A、1 人

B、2 人

C、3—4 人小组

D、5 人以上小队

105.绝对标高的水准原点指的是（ ）。

A、山脚平面

B、海平面

C、建筑地面

D、水池平面

106.喷完波尔多液后，要停（ ）才能施用石硫合剂。

A、7—15 天

B、15—30 天

C、1 周

D、1 个月后

107.下列昆虫中具有假死性的是（ ）。

A、竹蝗

B、蝉

C、金龟子

D、毒蛾

108.引起苗木立枯病的侵染性病原菌不包括（ ）。

A、丝核菌

B、镰刀菌

C、腐霉菌

D、曲霉菌

109.木麻黄青枯病是一种破坏输导组织， 引起全株性枯死的系统性病害，引起此病的病原是（ ）。

A、真菌

B、细菌

C、病毒

D、类菌质体

110.寄生性昆虫的某个虫期(主要是幼虫期) 生活于寄主体内的现象， 称为（ ）。

A、初寄生

B、次寄生

C、外寄生

D、内寄生

111.乐果属于（ ）。

A、内吸剂

B、胃毒剂

C、熏蒸剂

D、触杀剂

112.松材线虫病主要发生部位是（ ）。

A、根部

B、芽

C、叶片

D、树干

113.引起松针褐斑病的病原为（ ）。

A、真菌

B、细菌

C、病毒

D、原生动物

114.“速生、 丰产、 优质” 是对（ ）树种选择的要求。

A、防护林

B、薪炭林

C、用材林

D、特种用途林

115.反坡梯田整地田面向内倾斜成 3—15° 反坡， 埂内外侧均约（ ）。

A、30°

B、40°

C、50°

D、60°

116.抽槽整地的大抽槽规格一般是宽、 深各（ ）厘米。

A、40-60

B、60-80

C、80-100

D、100-120

117.以生产燃料为主要目的而培育的人工林称为（ ）。

A、用材林

B、防护林

C、薪炭林

D、特种用途林

118.采用高压蒸汽灭菌时，一般选用（ ）。

A、121℃20min

B、吸管 10 支一扎，尖头部用纸包好

C、试管要塞上合适的塞子

D、三角瓶塞上合适的塞子

119.下列测定方法不属于食品中砷的测定方法有（ ）。

A、砷斑法

B、银盐法

C、硼氢化物还原光度法

D、钼黄光度法

120.下列测定方法不能用于食品中糖精钠的测定的是（ ）。

A、高效液相色谱法

B、薄层色谱法

C、气相色谱法

D、离子选择电极法

121.用 95%的乙醇配制 75%的乙醇 500ml，下面配制正确的是（ ）。

A、量取 95%乙醇 395ml， 用水稀释至 500ml

B、量取 95%乙醇 395ml， 加入水 105ml， 混匀

C、量称 95%乙醇 375ml， 用水稀释 500ml

D、量取 95%乙醇 375ml， 加入 125ml 水混匀

122.过氧乙酸是一种高效广谱杀菌剂， 0.001%体积分数的过氧乙酸水溶液在（ ）内可杀死大肠杆菌。

A、15 分钟

B、10 分钟

C、8 分钟

D、6 分钟

123.下列动物中（ ）在我国没有野生个体。

A、驼鹿

B、驯鹿

C、猞猁

D、紫貂

124.种子的贮藏的方法（ ）。

A、干藏法

B、湿藏法

C、堆藏法

D、以上都有

125.林木种子湿藏的条件是（ ）。

A、经常保持湿润， 以防种子失水干燥

B、温度以 0-5℃为宜

C、通气良好

D、以上都有

126.病毒从（ ）侵入植物体。

A、气孔

B、伤口

C、皮孔

D、以上答案均不对

127.下列各种照射方法中，不属于内照射的是（ ）。

A、用放射性同位素溶液渍植物种子

B、将旋生同位素施入土中，供植物吸收

C、供给植物 14CO2，使其通过光合作用将 14CO2 同化到代谢物中去

D、用 X 射线照射植物种子

128.种子寿命的外界环境因素有（ ）。

A、温度、 湿度

B、氧气、 空气的相对湿度

C、通气条件

D、以上都有

129.输导组织在叶片表面形成的网络叫（ ）。

A、主脉

B、侧脉

C、脉

D、细脉

130.下列哪种花卉不宜作花坛用花（ ）。

A、鸢尾

B、凤仙花

C、大花君子兰

D、金盏菊

131.下列植物中常用分株方法繁殖的是（ ）。

A、一串红

B、鸡冠花

C、苏铁

D、一叶兰

132.蔷薇叶蜂产卵在（ ）。

A、叶片上

B、枝条上

C、土中

D、花中

133.由胚芽形成具有根、茎、叶的幼小植株叫（ ）。

A、小苗

B、幼苗

C、树苗

D、苗木

134.用硬枝扦插方法易成活的植物是（ ）。

A、广玉兰

B、梅花

C、月季

D、橡胶树

135.在移植过程中，适宜强修剪的苗木是（ ）。

A、金钱松

B、香樟

C、黄葛树

D、茶花

136.苗木定植后关键的管理措施是（ ）。

A、加强水份的管理

B、加强肥料的供给

C、加强光照的供给

D、加强修剪工作

137.施肥一般应选在（ ）施放。

A、阴天

B、晴天

C、雨天

D、下雪时

138.下列植物中，哪种植物的种子成熟后能较长时间挂留在树上，不易掉落，因而可在空闲时去采种（ ）。

A、樱桃

B、蒲葵

C、黄葛树

D、桃

139.从观赏的角度，万年青、文竹属于（ ）植物。

A、观花类

B、观叶类

C、观果类

D、观根类

140.依据生态习性，菊花是属于（ ）花卉。

A、一、二年生

B、水生

C、宿根

D、球根

141.根据花卉对光照要求的不同，月季属于（ ）花卉。

A、阳性

B、中性

C、阴性

D、强阴性

142.一年生花卉又称作（ ）花卉。

A、秋播

B、春播

C、宿根

D、球根

143.下面哪一种花卉是宿根花卉（)。

A、桂花

B、樱花

C、非洲菊

D、金鱼草

144.刺吸害虫主要以植物的（ ）为食。

A、叶片的叶肉

B、植物汁叶

C、植物的根部

D、叶片的叶脉

145.托布津为（)。

A、杀菌剂

B、杀虫剂

C、杀线虫剂

D、杀螨剂

146.星天牛是（)。

A、食叶害虫

B、蛀干害虫

C、地下害虫
D、刺吸害虫
147.日本龟蜡蚧是（ ）。
A、食叶害虫
B、刺吸害虫
C、蛀干害虫
D、地下害虫
148.园林绿化土壤中最理想的结构是（ ）结构。
A、片状
B、团粒
C、柱状
D、块状
149.下列属于间接性肥料的是（ ）。
A、铁肥
B、石灰
C、人类肥
D、硫酸铵
150.带叶的茎称为（ ）。
A、节间
B、叶腋
C、长枝
D、枝条
151.双子叶植物的根系多为（ ）。
A、不定根
B、须根系
C、直根系
D、定根
152.下列植物中，适宜用高压繁殖的是（ ）。
A、黄葛树
B、苏铁
C、广玉兰
D、菊花
153.女贞、蒲葵种子成熟的时间一般在（ ）。

A、春季
B、夏季
C、冬季
D、深秋
154.每天光照（ ）小时以上才能正常开花结果的植物叫长日照植物。
A、8 小时
B、10 小时
C、11 小时
D、12 小时
155.下列植物中，应随采随播的是（ ）。
A、云竹
B、松类
C、青桐
D、雏菊
156.从观赏的角度，佛肚竹、酒瓶兰属于（ ）。
A、观花、观叶类
B、观果、观花类
C、观茎、观果类
D、观叶、观茎类
157.女贞、蒲葵种子成熟的时间一般在（ ）。
A、春季
B、夏季
C、冬季
D、深秋
158.下列植物中，应随采随播的是（ ）。
A、云竹
B、松类
C、青桐
D、雏菊
159.从观赏的角度，佛肚竹、酒瓶兰属于（ ）。
A、观花、观叶类
B、观果、观花类
C、观茎、观果类

D、观叶、观茎类
160.不能在重庆露地越冬的花卉是（ ）。
A、金盏菊
B、金鱼草
C、龟背竹
D、吉祥草
161.属阴性花卉的是（ ）。
A、杜鹃
B、蕨类植物
C、月季
D、牡丹
162.五色草的主要用途是（ ）。
A、花丛花坛
B、毛毡花坛
C、花境
D、盆栽
163.不属于水生花卉的是（ ）。
A、睡莲
B、凤眼莲
C、荷花
D、水仙
164.蝗虫属于（ ）。
A、地下害虫
B、食叶害虫
C、蛀干害虫
D、刺吸害虫
165.多菌灵属于（ ）。
A、杀虫剂
B、杀菌剂
C、杀螨剂
D、杀线虫剂
166.利用黑光灯诱杀害虫的方法属（ ）。
A、化学防治法

B、物理防治法
C、生物防治法
D、植物栽培技术法
167.植物病虫害防治质量要求园林植物的病虫害应控制在（ ）。
A、10%
B、5%
C、20%
D、50%
168.不属于肥料三要素的是（ ）。
A、氮
B、钾
C、铁
D、磷
169.配制盆栽培养土时，培养土不应具有的特性是（ ）。
A、土壤紧实
B、透水性好
C、酸碱度适中
D、含丰富的腐殖质
170.植树是指种植胸径在（ ）厘米以下的乔木，高度在3.5米以下的灌木。
A、5
B、8
C、10
D、20
171.根据起带土乔灌木的起苗原则，土球大小应为树木胸径的（ ）倍。
A、8-10
B、5
C、3
D、10以上
172.土球直径在（ ）厘米以上时须用草绳包扎。
A、15
B、25
C、30
D、40

173.树桩盆景是以具体的植物为主要材料，让人足不出户就可领略山林野趣，小桥流水，田园风光，其最大的特点是（ ）。

A、生长缓慢

B、寿命较长

C、繁殖容易，修剪造型

D、萌发力强，耐荫，耐阳性强

174.下列树种中，适宜长枝扦插繁殖的有（ ）。

A、雪松

B、悬铃木

C、川茶花

D、桂花

175.下列植物中常用分株方法繁殖的是（ ）。

A、一叶兰

B、鸡冠花

C、苏铁

D、万寿菊

176.下列植物中不耐修剪的植物是（ ）。

A、小腊

B、珊瑚树

C、小叶榕

D、桂花

177.一串红常用（ ）方法进行繁殖。

A、扦插、嫁接

B、分株、扦插

C、播种、扦插

D、播种、分株

178.下列哪种花卉不是中国十大传统名花（ ）。

A、凤仙花

B、桂花

C、荷花

D、水仙花

179.下列哪种措施可推迟开花（ ）。

A、增温

B、长日照
C、激素处理
D、摘心
180.混合使用农药，要根据（ ）使用。
A、农药的理化性质
B、农药的毒性
C、农药的剂型
D、农药的理化性质、毒性、剂型
181.连续10年施用硝酸钙的土壤，其pH值会出现（ ）现象。
A、降低
B、升高
C、大幅度升高
D、大幅度降低
182.月季白粉病是由（ ）引起。
A、真菌
B、病菌
C、细菌
D、线虫
183.菊小筒天牛属（ ）。
A、食叶害虫
B、刺吸害虫
C、蛀干害虫
D、地下害虫
184.利用人工捕杀，刮刷病虫的方法属（ ）。
A、化学防治法
B、生物防治法
C、物理防治法
D、植物栽培技术防治法
185.常绿乔木的定型修剪，定干高度为（ ）。
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3米以上

186.花灌木的养护修剪原则，应保持（ ）自然丰满的树形。

A、内高外低

B、内空

C、内空外低

D、外高内空

187.根据草坪管理质量标准，草坪应保持无秃空缺，覆盖率达（ ）以上。

A、80%

B、85%

C、90%

D、95%

188.按照树木养护管理质量要求，病虫害明显危害株数，应控制在（ ）以下。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

189.重庆地区制作丛林式盆景，常采用竹类植物中较多的是（ ）。

A、凤尾竹

B、棕竹

C、南天竹

D、云竹

190.山水盆景的分类形式表现高远、深远、平远手法的类别是（ ）。

A、规则式

B、水旱类

C、自然式

D、水式类

191.下列（ ）花卉不是一二年生花卉中具有藤本性状的种类。

A、茑萝、园叶茑萝、槭叶茑萝、大花牵牛

B、小牵牛、月光花、小葫芦、红花菜豆

C、香碗豆、凌霄、牵牛、茑萝

D、山牵牛、月光花、小葫芦、红花菜豆

192.变叶木、一叶兰（蜘蛛抱蛋）、龙血树、鹅掌柴，其中（ ）对不强度的要求最高。

A、一叶兰（蜘蛛抱蛋）

B、变叶木
C、鹅掌柴
D、龙血树
193.树桩盆景最适宜的翻盆时期是（ ）。
A、生长旺盛时
B、最佳观赏期
C、春季发芽时
D、全年任何时间
194.水仙、百合的茎属于（ ）。
A、根状茎
B、块茎
C、球茎
D、鳞茎
195.穴盘自身的质量在（ ）克以上的为重型穴盘。
A、50
B、100
C、150
D、200
196.下列哪项（ ）不是植物组织液体培养的优点。
A、操作方便
B、培养物吸收营养比较充分
C、气体交换好
D、容易获得均一的组织群体
197.器育苗中，营养土配制不常用的材料是（ ）。
A、腐殖质土
B、泥炭土
C、珍珠岩
D、复合肥
198.在下列植物繁殖方法中，可以使新体成形快，并可提前开花结果，对有些花木有矮化作用的是（ ）。
A、播种
B、扦插
C、嫁接

D、压条

199.容器育苗营养土的PH常为（ ），适应很多针叶树苗木的生长。

A、5.6-7.0

B、7.0-7.5

C、4.5-5.5

D、3.5-4.5

200.某种植物被引种到新环境时，需要一个由不适应到适应的过程，需经人工培育，改变植物的遗传性，这样的驯化称为（ ）。

A、自然驯化

B、人工驯化

C、复杂驯化

D、气候驯化

201.在下列植物生长调节剂中，（ ）一般不用于促进插穗生根。

A、引哚乙酸

B、引哚丁酸

C、萘乙酸

D、矮壮素

202.按生态习性一，一般将草本花卉分为（ ）。

A、露地花卉和温室花卉

B、观叶植物和观花植物

C、草本花卉和木本花卉

D、一年生花卉和多年生花卉

203.菊花属于（ ）日照植物。

A、长

B、短

C、中性

D、长短

204.为有利于植株根系生长，盆钵底部的泄水孔应（ ）。

A、让水畅通无阻

B、让水无法流出

C、具有一定的排水能力

D、堵住

205.苗木移栽时，包裹土球的草绳应（ ）。

A、剪断
B、不做处理
C、全部拆除
D、用火烧掉
206.非洲菊采收期为中部花心外围的管状花有（ ）轮开放。
A、1-2
B、2-3
C、4-5
D、全部
207.菊花在我国有悠久的园艺栽培史，有多种园林用途，目前在国际花市上以（ ）为主要用途。
A、切花
B、盆花
C、花坛
D、绿地配置
208.在下列观赏树木中，花期在夏天的是（ ）。
A、紫薇
B、紫荆
C、桃花
D、梅花
209.盆栽仙客来浇水施肥应从（ ）处。
A、植株顶端
B、叶面
C、球顶
D、盆边
210.为保证国庆节如期开花，需要进行遮光处理的是（ ）。
A、瓜叶菊
B、月季
C、一品红
D、天竺葵
211.当土壤速效磷含量低于（ ）mg/Kg 时，说明土壤供磷水平低。
A、10
B、15

C、20
D、30
212.降低营养液的PH值范围可用（ ）进行调节。
A、盐酸
B、磷酸
C、石膏
D、氢氧化钠
213.灰霉病是由（ ）引起。
A、真菌
B、细菌
C、病毒
D、类菌质体
214.下列哪一项不属于土壤的四大肥力因素（ ）。
A、水分
B、养分
C、母质
D、空气
215.下列花序中（ ）是有限花序。
A、总状花序
B、单歧聚伞花序
C、伞形花序
D、伞房花序
216.下列花冠中（ ）不属于整齐花。
A、十字形花冠
B、蔷薇形花冠
C、漏斗形花冠
D、蝶形花冠
217.下列花冠中（ ）不属于离瓣花冠.
A、十字形花冠
B、蔷薇形花冠
C、漏斗形花冠
D、蝶形花冠
218.水仙、百合的茎是（ ）。

A、机械组织
B、输导组织
C、保护组织
D、分生组织
219.根尖生长点又叫生长锥，属于（ ）。
A、机械组织
B、输导组织
C、保护组织
D、分生组织
220.表皮属于（ ）。
A、保护组织
B、通气组织
C、同化组织
D、分泌组织
221.下列果实，（ ）属于梨果。
A、葡萄
B、苹果
C、桃
D、柿
222.下列果实，（ ）属于瓠果。
A、葡萄
B、西瓜
C、枇杷
D、柑橘
223.下列果实，（ ）属于荚果。
A、芒果
B、羊蹄甲
C、夹竹桃
D、油菜
224.下列果实，（ ）不属于颖果。
A、小麦
B、水稻
C、牡丹

D、玉米
225.裸子植物的主要特征是（ ）。
A、雌雄异株
B、两性花
C、有“球果"
D、种子裸露
226.被子植物区别于裸子植物的主要特征是（ ）。
A、雌雄异株
B、两性花
C、有胚乳
D、种子有心皮包被
227.丁香的分枝形式是（ ）。
A、单轴分枝
B、合轴分枝
C、二叉状分枝
D、假二叉状分枝
228.下列植物，（ ）是百合科植物。
A、莎草
B、麦冬
C、莴尾
D、春兰
229.下列植物，（ ）是十字花科植物。
A、桂竹香
B、三色堇
C、一品红
D、桂花
230.下列植物，（ ）不是五加科植物。
A、鹅掌藤
B、孔雀木
C、鸭脚木
D、凤凰木
231.下列植物，（ ）不属于禾本科。
A、佛肚竹

B、文竹
C、青皮竹
D、凤尾竹
232.下列棕榈植物，（ ）是丛生常绿灌木。
A、鱼尾葵
B、散尾葵
C、老人葵
D、金山葵
233.下列棕榈植物，（ ）是常绿大乔木。
A、鱼尾葵
B、散尾葵
C、美丽针葵
D、袖珍椰子
234.植物种子内的营养物质有（ ）。
A、糖类、核酸、脂肪
B、糖类、蛋白质、脂肪
C、蛋白质、脂肪、维生素
D、糖类、核酸、维生素
235.组成蛋白质的氨基酸有（ ）。
A、8 种
B、12 种
C、20 种
D、32 种
236.维管束包括（ ）组织。
A、同化组织、贮藏组织、保护组织、输导组织
B、保护组织、分生组织、输导组织、贮藏组织
C、分生组织、输导组织、机械组织、贮藏组织
D、吸收组织、分泌组织、机械组织、输导组织
237.完全花是指包括（ ）的花。
A、花柄、花托、雌蕊、雄蕊
B、花萼、花冠、雌蕊、雄蕊
C、花柄、花冠、雌蕊、雄蕊
D、花托、花冠、雌蕊、雄蕊

238.花程式中,花冠由（ ）表示。
A、“G”
B、“K”
C、“A”
D、“C”
239.竹类的长高，主要是（ ）的作用。
A、顶端分生组织
B、侧生分生组织
C、居间分生组织
D、形成层
240.根的次生构造由外向内依次是（ ）。
A、木栓层、初生韧皮部、次生韧皮部、形成层、次生木质部、初生木质部
B、周皮、初生韧皮部、次生韧皮部、形成层、次生木质部、初生木质部
C、周皮、次生韧皮部、初生韧皮部、形成层、初生木质部、次生木质部
D、周皮、初生韧皮部、次生韧皮部、形成层、初生木质部、次生木质部
241.土壤的组成中，空气占土壤总容积的（ ）。
A、50%
B、20%—30%
C、48%
D、2%
242.土壤最理想的固相、液相、气相（三相）的容积比为（ ）。
A、1：2:2
B、2：2:1
C、1：1：2
D、2:1:1
243.由有机质腐殖化以后形成的胶体称为（ ）。
A、有机胶体
B、无机胶体
C、复合胶体
D、有机无机胶体
244.由岩石风化作用，产生微细粒子形成的土壤胶体为（ ）。
A、由机胶体
B、无机胶体

C、复合胶体

D、有机无机胶体

245.施入土壤中的肥料与土壤中某些物质产生化学变化而被固定或保存下来，这种吸收作用称为（ ）作用.

A、机械吸收

B、物理吸附

C、化学吸附

D、生物吸收

246.土壤溶液中（ ）增加时，土壤呈酸性反应。

A、“OH”

B、“H＋"

C、“Na＋"

D、“H2O”

247.土壤水分中几种子类型中，（ ）对植物是全部有效水。

A、吸湿水

B、膜状水

C、毛管水

D、重力水

248.在一般情况下，微生物分解有机物最适合的碳氮比是（ ）。

A、15：1

B、20：1

C、25：1

D、30：1

249.按照施肥的目的和时期可分为（ ）。

A、基肥、穴施、条施、环施

B、追肥、撒施、沟施

C、全面施肥、局部施肥

D、基肥、追肥、种肥、根外追肥

250.硝态氮肥施用后，硝酸根离子只能被（ ）所吸收.

A、土壤

B、植物

C、细菌

D、真菌

251.下列肥料中（ ）为化学肥料。

A、饼肥

B、粪尿肥

C、硝酸钾

D、氯化钾

252.草木灰含钾元素的主要成分是（ ）。

A、硫酸钾

B、碳酸钾

C、硝酸钾

D、氯化钾

253.花卉植物在生长过程中整株失去绿色，下部叶子变黄,表示其缺少（ ）元素。

A、K

B、N

C、P

D、C

254.常见化学肥料中,（ ）为复合肥料。

A、过磷酸钙

B、碳酸氢铵

C、磷酸铵

D、硝酸铵

255.以下不属于有机肥料的是（ ）。

A、饼肥

B、绿肥

C、复合肥

D、堆肥

256.有机肥料在腐熟过程中，含 C/N 比大于 25/1 的有机物分解速度（ ）。

A、快

B、较

C、一般

D、慢

257.桑褐刺蛾、褐边绿刺蛾、扁刺蛾的茧结在（ ）。

A、地下

B、枝干上

C、有时地上有时枝干上

D、叶上

258.（ ）成虫一般都有假死性，可利用人工振落捕杀.

A、大蟋蟀

B、金龟子

C、叶蝉

D、凤蝶

259.月季白粉病叶上的白粉是（ ）。

A、病症

B、性状

C、病状

D、病态

260.棕榈腐烂病有心腐、杆腐两种类型，其病原是（ ）。

A、心腐是生理性病原引起的，杆腐是非生理性病原引起的。

B、心腐是侵染性病原引起的，杆腐是非侵染性病原引起的。

C、心腐、杆腐均是生理性病原引起的。

D、心腐、杆腐均是侵染性病原引起的。

261.卵胎生的昆虫是以（ ）作为营养的。

A、母体营养

B、卵黄

C、取食植物

D、捕食昆虫

262.各种病的潜育期均不同，白粉病的潜育期是（ ）。

A、1—2 天

B、4—5 天

C、10 天左右

D、15 天以上

263.植物病原细菌是结构简单的单细胞生物,有几种形态，下列（ ）不是植物病原细菌.

A、球状

B、杆状

C、螺旋状

D、三角状

264.下列昆虫，（ ）属于食根性昆虫.

A、刺蛾

B、金针虫

C、茎蜂

D、蜗牛

265.国家已经明文公布了一些农药禁止使用，以下（ ）属于禁止使用的。

A、融杀蚧螨

B、杀虫脒

C、杀灭菊脂

D、多菌灵

266.国家已经明文公布了一些农药禁止使用,以下（ ）不属于禁止使用的。

A、杀虫脒

B、敌枯双

C、杀灭菊脂

D、毒鼠强

267.刺蛾的天敌昆虫有几种，下列（ ）不是刺蛾的天敌。

A、上海青蜂

B、红环瓢虫

C、紫姬蜂

D、伞裙追寄蝇

268.红蜘蛛的危害性很大,现在主要使用的农药是（ ）。

A、乐果

B、敌百虫

C、克螨特

D、青虫菌

269.桃树上常见的由细菌引起的病害是（ ）。

A、穿孔病

B、灰霉病

C、锈病

D、叶斑病

270.易感染丛枝病的竹子一般年龄是（ ）以上。

A、一年

B、二年

C、三年

D、四年

271.防治煤污病除消灭刺吸性害虫外,还可以使用（ ）。

A、多菌灵

B、代森锌

C、退菌特

D、托布津

272.下列昆虫，属于刺吸性害虫的是（ ）。

A、刺蛾

B、红蜡蚧

C、金星尺蠖

D、金龟子

273.配制波尔多液时,若用消石灰代替生石灰也可，但用量需要增加（ ）%.

A、10

B、10—20

C、30—50

D、60

274.拌种用的药量，一般为种子重量的（ ）%。

A、0.1

B、0.2—0.5

C、1—2

D、3

275.月季黑斑病主要危害（ ）。

A、叶

B、茎

C、根

D、花

276.下列病害,属于生理性病害的是（ ）。

A、煤污病

B、白绢病

C、白粉病

D、日灼病

277.下列病害,属于寄生性种子植物病害的是（ ）。

A、兔丝子

B、炭疽病

C、黑斑病

D、紫纹羽病

278.下列树种，（ ）不属于苏木科。

A、羊蹄甲

B、凤凰木

C、金凤花

D、龙船花

279.下列树种，（ ）是常绿乔木，叶互生，薄革质。花单生,极香，白色。

A、玉兰

B、白兰

C、二乔木兰

D、黄兰

280.柏科植物中，（ ）的主要特征是乔木，树冠圆锥状塔形，侧枝螺旋向上，多为鳞叶。

A、龙柏

B、侧柏

C、扁柏

D、球柏

281.木兰科植物的花很明显，其中腋生的是（ ）。

A、广玉兰

B、白玉兰

C、紫玉兰

D、含笑

282.下列木兰科树种，（ ）全是落叶树.

A、白玉兰、紫玉兰、广玉兰

B、广玉兰、白玉兰、含笑

C、紫玉兰、二乔玉兰、玉兰

D、含笑、二乔玉兰、山玉兰

283.（ ）常绿乔木,树皮有肉桂香味，叶革质，对对生，离基三出脉。

A、香樟

B、阴香

C、肉桂
D、桂花
284.下列各竹类中，（ ）常绿灌木型丛生竹,节间短而膨大,叶条形，绿色，密集。
A、青皮竹
B、佛肚竹
C、凤尾竹
D、粉单竹
285.树木对环境的适应度能力有强弱，下列（ ）属于耐碱性树种.
A、山茶
B、侧柏
C、 杜鹃
D、桅子花
286.裸子植物的主要特点是（ ）。
A、典型柔荑花序
B、胚株裸露
C、木质部具导管
D、韧皮部有伴胞
287.下列树种，具托刺的植物是（ ）。
A、小檗
B、火棘
C、月季
D、刺槐
288.下列树种，具有皮刺的植物是（ ）。
A、刺槐
B、云实
C、皂荚
D、石榴
289.下列植物，（ ）是多年草本，常用来作地被植物。
A、非洲菊
B、蟛蜞菊
C、一串红
D、黄金叶
290.以气生根进行攀援的藤本植物是（ ）。

A、紫藤
B、爬山虎
C、凌宵
D、葡萄
291.下列植物中，（ ）是攀缘木质藤本植物。
A、叶子花
B、白粉藤
C、炮仗
D、爆仗竹
292.下列植物，（ ）是多年生草质藤本，茎上生有多数气生根。
A、白蝴蝶
B、天门冬
C、马缨丹
D、紫锦草
293.奇数羽状复叶、对生的是（ ）。
A、紫藤
B、南天竹
C、苦楝
D、白蜡
294.竹秆上的叶称为（ ）。
A、竹叶
B、竹箨
C、内稃
D、外稃
295.竹节内的上面一环称为（ ）。
A、节内
B、竹箨
C、秆环
D、箨环
296.秆环与箨环之间，生竹枝的部位，称为（ ）。
A、竹节
B、节间
C、竹米

D、节内

297.四季海棠属于（ ）秋海棠类。

A、须根

B、根茎

C、球根

D、块根

298.下列（ ）组的两种植物都常用分株法繁殖.

A、天竺葵、芍药

B、美人蕉

C、非洲菊、四季海棠

D、文竹、山茶花

299.下列（ ）组的两种植物都常用扦插法繁殖。

A、美人蕉、扶朗花

B、百合、瓜叶菊

C、大丽花、菊花

D、美人蕉、鸡冠花

300.下列花卉，（ ）主要以苞片为观赏对象。

A 马蹄莲

B、叶子花

C、一串红

D、美人蕉

301.散尾葵的繁殖主要方法是（ ）。

A、播种

B、分株

C、剪接

D、 扦插

302.一级草坪的高度一般应在（ ）cm。

A、1—2

B、4—6

C、8—10

D、10—12

303.芒果一般用（ ）繁殖。

A、分株

B、扦插
C、播种
D、圈枝
304.短日照花卉每天有（ ）小时日照,就能加快发育，提前开花.
A、5—8
B、8—12
C、12
D、13-15
305.土壤酸碱性能直接影响花卉生长,绝大部分花卉适于（ ）土壤生长。
A、石灰性
B、酸性
C、中性碱性
D、中性偏酸
306.切花若需包扎、运输。应在（ ）切取。
A、清晨
B、上午
C、午后
D、傍晚
307.下列各组花卉中，（ ）组都是观叶花卉。
A、变叶木、绿萝、一叶兰
B、变叶木、黄蝉、一叶兰
C、红青桂、龙船花、黄蝉
D、红背桂、龙船花、绿萝
308.花坛花卉一般以露地（ ）为主。
A、一、二年生草花
B、宿根花卉
C、木本花卉
D、球根花卉
309.在下列各组一、二年生草花中，（ ）组除播种外，还可扦插繁殖。
A、孔雀草、一串红
B、鸡冠花、一串红
C、香雪球、一串红
D、 羽衣甘兰、一串红

310.龟背竹的叶形为（ ）。

A、幼叶、老叶均心脏形

B、幼叶、老叶均羽状深裂

C、幼叶心脏形、老叶羽状深裂

D、幼叶羽状深裂、老叶心脏形

311.海南红豆（ ）。

A、繁殖用播种法，种子必须随采随播

B、繁殖用播种法，种子必须晒干后第二年播。

C、繁殖用扦插法,采用嫩枝扦插。

D、繁殖用扦插法，采用硬枝扦插。

312.间苗一般应（ ）。

A、越早越好

B、真叶发生后即可进行

C、在苗长至4—5片真叶时进行

D、越晚越好

313.苏铁、山茶等喜酸性花卉，在土壤变碱时叶会黄化，这时应施（ ）。

A、尿素

B、过磷酸钙

C、磷酸二氢钾

D、硫酸亚铁

314.下列（ ）组花卉,在修剪后乳汁从剪口处流出。

A、韭兰、橡皮树、雁来红

B、橡皮树、一品红、虎刺

C、扶桑、一品红、仙客来

D、美人蕉、一叶兰、孔雀草

315.荷花的藕，在植物学上为（ ）。

A、根

B、茎

C、叶

D、果

316.塘栽荷花夏季水位一般宜控制在（ ）。

A、10—-20

B、30-—40

C、50——80
D、100———120
317.制图中，（ ）表示实际物体轮廓线。
A、虚线
B、实线
C、点划索
D、折断线
318.下列树种，具有双色叶的是（ ）。
A、红背桂
B、糖胶树
C、麻楝
D、金边黄杨
319.下列树种，具异色叶的是（ ）。
A、糖胶树
B、红背桂
C、金边黄杨
D、红枫
320.六株树丛栽不能采用（ ）的分组。
A、1：5
B、2:4
C、3：3
D、4：2
321.花卉布置中，（ ）作为规则式到自然式过渡的半自然或种植形式。
A、花坛
B、花丛
C、花池
D、花镜
322.单位专用绿地属于园林绿地（ ）的形式。
A、点
B、线
C、面
D、环
323.在（ ）车间绿化中,应选择有叶子不返光、叶色暗淡、花色淡雅而清香的树

种.

A、精密仪器

B、有噪声

C、高温

D、有污染

324.双面观赏花镜,应设置于（ ）。

A、绿篱边缘

B、道路中间

C、墙边

D、建筑物边缘

325.密林有郁闭度在（ ）%范围内。

A、50——70

B、0——30

C、70--100

D、30———50

326.图纸的图框线离图纸左侧应为（ ）mm。

A、10

B、5

C、30

D、25

327.下列植物中,（ ）属于阴性植物。

A、荷花

B、兰花

C、玫瑰花

D、鸡蛋花

328.下列树种,（ ）属于耐旱植物。

A、龙舌兰

B、垂柳

C、红树

D、龟背蕉

329.三株树配植,在平面上应为（ ）。

A、等腰三角形

B、不等边三角形

C、等边三角形
D、直线
330.树群内树木栽植距离要（ ）。
A、疏密变化
B、构成等边三角形
C、成排
D、直线
331.三株树配植，要求（ ）靠近。
A、最大与中号
B、中号与最小
C、最大与最小
D、三株
332.规则式与自然式园林都可采用的种植形式是（ ）。
A、丛植
B、行列式
C、绿篱
D、孤植树
333.花坛一般高出地面（ ）cm。
A、5
B、10
C、15
D、20
334.（ ）不属于草坪材料。
A、天鹅绒草
B、B、马尼拉草
C、C、高羊茅草
D、D、红花酢浆草
335.小型草坪常用的排水方法是（ ）。
A、明沟
B、地表径流
C、暗沟
D、暗沟和地表径流
336.促进枝叶生长的生长激素，是由（ ）合成的。

A、叶与芽
B、枝干
C、花与果
D、根系
337.枝条旺盛生长期，田间持水量应保持在（ ）%左右。
A、30——40
B、40——50
C、50——60
D、60——80
338.适宜树木生长的土壤含氧量在（ ）%左右。
A、5
B、10
C、15
D、20
339.一般树木根系生长的适适宜于温度是（ ）。
A、0——5
B、5——10
C、15——25
D、25——30
340.不同部位的芽在质量上有差异，这种芽的异质性是指（ ）。
A、在同一枝条上
B、在不同枝条上
C、在同一株树上
D、在不同树种间
341.早熟性芽是指（ ）的芽。
A、分化成熟早
B、分化成熟晚
C、当年形成、当年萌发
D、当年形成、次年萌发
342.晚熟性芽是指（ ）芽。
A、分化成熟早
B、分化成熟晚
C、当年形成、当年萌发

D、当年形成、次年萌发

343.树木顶端优势的现象表现在（ ）。

A、乔木上

B、灌木上

C、藤木上

D、各种树木上

344.大树移植时要进行平衡修剪，这工作在（ ）进行。

A、移前半年

B 移前三个月

D、移前半个月

E、D、移后半个月

345.地径是指（ ）处的树干直径。

A、树木根茎

B、地上 10cm

C、地上 20cm

D、离地 1.3cm

346.挖掘带土球的乔木，其土球直径通常是该乔木胸径的（ ）倍.

A、3-4

B、5—6

C、8—9　　D

、10—12

347.挖掘带土球的灌木，其土球直径通常是该灌木根丛的（ ）倍。

A、1

B、1.5

C、2

D、3

348.短截修剪有轻、中、重之分，一般轻剪是剪去枝条的（ ）。

A、顶芽

B、1/3 以内

C、1/2 左右

D、2/3 左右

349.为减少落花落果，提高座果率，环状剥皮应（ ）进行。

A、花芽分化期

B、开花前

C、盛花期

D、落花后

350.树木落后及时修剪，对树木能（ ）。

A、增强长势、减少分枝

B、增强长势、增加分枝

C、减弱长势、增强分枝

C、减弱长势、减少分枝

二、多项选择题(第 1 题～第 70 题。选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中，多选或少选均不得分。)

1、作为孤植树应具备的条件（　）

A、树形优美，轮廓富于变化

B、花大而美

C、寿命长

D、常绿

2、道路绿化设计的总原则是（　）

A、以乔木为主，乔、灌、草相结合

B、保证道路行车安全

C、植物配置应与市政设施相协调

D、近期效果与长期效果相结合

3、下列园林植物选择上体现了园林布局在时间上的规定性的有（　）

A、春季以鲜花为主

B、植物的季相变化

C、植物乡土化

D、夏荫秋实

4、模纹花坛在选用植物上应（　）

A、生长缓慢

B、耐修剪

C、分枝密

D、色彩分明

5、园林植物的选择原则应做到（　）

A、以乡土树种为主

B、适地适树

C、对原有树木和植被加以利用

D、速生与慢长相结合。

6、控制花坛植物花期的措施有（　）

A、分期播种

B、低温处理

C、光照处理

D、药物刺激

7、我国古典园林常见的形式有（　）

A、皇家园林

B、私家园林

C、寺庙园林

D、风景名胜园林

8、关于行道树株距与定干描述正确的有（　）

A、株行距一般按树冠大小来决定

B、定干高度应考虑距车行道的距离

C、分枝角度越大，定干可适当低一点

D、定干高度最低不能小于 2 米

9、关于学校绿地的设计，正确的有（　）

A、绿地率要不低于 30%

B、树种应选择无毒无污染树种

C、教学楼的绿化要保证教室内采光

D、大门内外绿化以装饰绿地为主

10、屋顶花园植物应选择（　）

A、不易倒伏树种

B、耐修剪

C、阴性耐旱

D、抗寒性强

11、水生植物在水体中的布置正确的是（　）

A、不超过水面的 1/3

B、有疏有密

C、沿池岸种植一圈

D、设置种植床

12、园林中的生活美包括有（　）

A、园林中空气清新、卫生条件好、水体清洁

B、适于人生活的小气候

C、交通方便，有各种活动场所

D、风摇松涛

13、属于自然式种植的是（　）

A、列植

B、丛植

C、群植

D、林植

14、属于工厂企业绿地特点的是（　）

A、环境较差不利于植物生长

B、绿化用地面积大

C、绿化要保证工厂的生产安全

D、工厂绿化的服务对象主要是本厂职工

15、三株树丛配置的原则是（　）

A、树种搭配不超过两种

B、各株树应有姿态、大小的差异；

C、最大的一株稍远离

D、三株不在同一条直线上，且不为等边三角形

16、下列关于对比的描述正确的有（　）

A、以短衬长，长者更长；以低衬高，高者更高；以大衬小，小者更小

B、大中见小，小中见大

C、垂直与水平的对比属于空间的对比

D、山与水的对比属于虚实的对比

17、道路绿化的总原则是（　）

A、以乔木为主，乔、灌、草相结合

B、保证道路行车安全

C、植物配置应与市政设施相协调

D、近期效果与长期效果相结合

18、按绿篱的高度可分为（　）

A、绿墙目

B、高绿篱

C、中绿篱

D、矮绿篱

19、单子叶植物区别于双子叶植物的特征有(　　)。

A、茎内无排成环状的形成层，一般不能增粗。

B、胚具有一枚子叶。

C、叶常为平行脉或孤状脉。

D、根多为须根系。

20、双子叶植物区别于单子叶植物的特征有（　　）。

A、茎内有排成环状的形成层,可以增粗。

B、胚具有二枚子叶。

C、叶常为网状脉。

D、根多为直根系.

21、以下各种描述,属于蔷薇拉植物的特征是（　　）。

A、单叶或复叶，互生或对生，一般有托叶.

B、花多两性，少单性，辐射对称。

C 果实为核果。

D、伞形花序.

22、团粒结构土壤有利植物生长发育的原因有(　　)。

A、毛管孔隙和非毛管孔隙并存，具有一定比例，因此三相比适当，水、气协调。

B、大孔隙有利于透气,小孔隙有利于保水保肥,使微生物的活动条件得到了保证。、

C、有利于养分的供给和贮存，能长期不断地满足植物生长发育的需要.

D、团粒结构土壤中,水较少、气较多.

23、培育团粒毕构土壤，主要措施有(　　).

A、增施生石灰。

B、增加沙的含量。

C、精耕细作.

D、增施有机肥。

24、土壤空气对植物生长发育直接影响有(　　)。

A、通气良好时，根系长、生长量大、色浅，根群新鲜发达。

B 通气不足，影响种子内含物转化和能量释放,使种子萌发受到影响，严重时造成烂种。

C、通气不足，影响微生物活动，不利于有机质转达化。

D、严重通气不良，易产生甲烷、硫化氢等毒气，影响植物生长，甚至死亡。

25、N 的生理作用是（　　）。

A、是蛋的白质和核酸的重要组成分。

B、是叶绿素的主要组成成分.

C、是各种酶和多种维生素的成分.

D、能提高抗性。

26、P 的生理作用是（　　）。

A、构成植物细胞核的主要组成成分。

B、是叶绿素的主要组成成分。

C、是各种酶和多种维生素的成分。

D、能提高抗性。

27、K 的生理作用是（　　）。

A、构成植物细胞核的主要组成成分。

B、促进光合作用，提高强度。

C、促进碳化合物的形成,提高产量，改善品质。

D、能提高抗性。

28、以下属于过磷酸钙的性质的是（　　）。

A、灰色，粉末划颗粒状，微溶于水。

B、含磷理 16%—18%。

C、生理酸性肥料。

D、生理碱性肥料。

29、施用过磷酸钙,为防止磷被固定,可采用以下施用方法（　　）。

A、集中施用。

B、与有机肥混合施用。

C、根外追肥。

D、制成颗粒肥。

30、以下属于常见的地下害虫有（　　）。

A、蛄蝼

B、地老虎

C 金针虫

D、蚜虫

31、防治蛴螬的方法有(　　)。

A、施腐熟的肥料，可避免金龟子产卵。

B、黑光灯或火堆诱杀成虫。

C、冬耕深翻，消灭越冬蛴螬。
D、苗期危害时，可浇施 50%马拉松 800—1000 位数，茶籽 6 位数，石蒜类液。
32、防治香樟黄化病的措施有（　　）
A、栽植地应选排水良好，微酸性肥沃的土壤。
B、在患病植株际周围打孔，浇灌 30-50 克倍硫酸亚铁.
C、在树杆注射硫酸亚铁 15 克、尿素 50 克、硫酸镁 5 克、水 1000ml 的混合液。
D、栽植地应选排水良好，碱性肥沃的土壤.
33、合理使用农药，要做到（　　）。
A、了解药剂的适用范围，对症下药。
B、掌握时机,适时施药，用药适量。
C、选择适当的使用方法,注意药剂的交替作用.
D、选择对植物无害、能保护天敌的药剂.
34、松、杉、柏、三个科形态特征上相同的是(　　)。
A、种子都在大孢子球内（俗称球果)。
B、成熟时种磷开裂,露出种了。
C、叶都是单叶，通称为针叶树种.
D、叶都是复叶。
35、松科植物不同于杉、柏科植物的形态特征有（　　）。
A、叶有条形、锥形、少数刺形、鳞形.
B、叶有针形、条形两种。
C、多数松科植物有长短枝。
D、叶在枝上散生,在短枝上簇生或束生.
36、杉科植物不同于松、柏科植物的形态特征有(　　)
A、叶有条形、锥形、少数刺形、鳞形.
B、叶有针形、条形两种。
C、叶除水杉外都是互生。
D、球果全部顶生，种鳞内种子数在 2—9 之间。
37、柏科植物不同于松、杉科植物的形态特征有（　　）。
A、叶有针形、条形两种。
B、球果着生部位与数目变化较大，种鳞内的种子为 1—多数。
C、刺叶一般轮生，鳞叶全部对生。
D、单性花全部同株。
38、紫玉兰区别于白玉兰的形态特征有（　　）

A、一般为大型的灌木.
B、花芽常显绿色。
C、花芽颜色因白色茸毛较多，偏向白色.
D、花紫色，花萼黄色，披针形，不呈辩化现象.
39、含羞草科、苏木科、蝶形化科原来都属于豆科，他们相同点有（　　）
A、果实为荚果
B、都是5基数
C、花都是白色
D、花冠左右对称
40、藤本树种的攀援方式多种，其中不用吸盘吸附攀援的树种有（　　）
A、云实
B、凌霄
C、葡萄
D、爬山虎
41、按照花卉对温度的不同要求，可将花卉分为（　　）
A、极耐寒性花卉
B、耐寒性花卉
C、半耐寒性花卉
D、不耐寒花卉
42、按照花卉对光照强度的不同要求，可将花卉分为（　　）
A、阳性花卉
B、半阴花卉
C、阴性花卉
D、强阴性花卉
43、按照花卉对日照长短的不同要求，可将花卉分为（　　）
A、超长日照花卉
B、长日照花卉
C、中日照花卉
D、短日照花卉
44、按照花卉对水分的不同要求，可将花卉分为(　　)
A、水生花卉
B、湿生花卉
C、中生花卉

D、旱生花卉

45、地被植物的配置原则有（　　）

A、充分了解种植在环境和地被植物本身的习性。

B、按园林绿地的不同性质‘功能来配置地被植物。

C、选择地被植物的高度要与树木搭配适当。

D、色彩要协调，四季有景观。

46、花丛花坛的位置一般设置在(　　)

A、建筑物周围

B、塑像前面

C、公园边缘地带

D、树丛前面

47、模纹花坛的要求与特点有（　　）

A、面积不宜过大.

B、多有整齐的几何图案、曲线图案、物像、文字来表现。

C、线条简单、清晰。

D、观叶植物材料，要求叶细密、分枝性强、耐修剪、叶色区别明显.

48、盆栽杜鹃的养护管理的正确措施有(　　)

A、土壤以保持湿润为度，忌积水‘经常叶面喷水。

B、忌浓肥，原则上是“薄肥勤施”。

C、春季施花前长蕾肥，以磷为主。

D、花后施花后生长肥，以氮为主.

49、区分阳性树与阴性树的主要特征有（　　）

A、针叶树叶针形有多阴性，披针状、磷状的多阴性.

B、阔叶树中落叶树多阴性，常绿树多阴性。

C、枝叶稀疏的多阳性，枝叶茂密的都阴性。

D、叶片较薄、叶色较淡的多阴性，叶片较厚、叶色较深的多阴性。

50、园林植物的配置原则有（　　）

A、在配置方式上,服从于园林绿地的性质、功能，并与期总体艺术布局想协调。

B、要考虑四季景色的季想变化.

C、要考虑植物造景在形、色、味、韵上综合应用.

D、要恰当处理园林植物的通相与殊相，即具对比与调和的关系。

51、三株配置的要求有（　　）

A、三株树组成树丛，树种可以是三种。

B、栽植时三株不能成一直线。
C、栽植时三株不能成等边三角形或等三角形，一般呈角三角形较为适量。
D、三株中最大的和最小要要尽时靠近.
52、摘心的作用有（　　）
A、能提高光合作用效率。
B、能促进二次枝萌发.
C、减小落花落果,提高座果率.
D、能促进叶芽向花芽的转化。
53、做好树木的根外追肥工作应该做到（　　）
A、尽量选用磷酸盐类肥料，慎用或不用硝酸盐类肥料.
B、严格把握配制浓度，不可随便地估算。
C、要选择阳光较弱、气温较低、蒸发量小、无风的天气在傍晚喷洒。
D、喷洒要尽量喷在叶片尤其是叶背，及幼果和幼嫩的绿色组织上。
54、水景工程包括小型水闸（　　）等。
A、驳岸
B、护坡
C、水池
D、喷泉
55、绿化工程包括（　　）等。
A、乔灌木种植工程
B、大树移植
C、小树移植
D、草坪工程
56、现代园林包括（　　）附属绿地、生产防护绿地等各种城市绿地。
A、庭院
B、宅院
C、小游园
D、公园
57、春色叶枝有：（　　）
A、臭椿
B、葡萄
C、沙兰杨
D、五角枫

58、独生花相的树木有：（　　）

A、苏铁

B、云南苏铁

C、蓖齿苏铁

D、南洋杉

59、果实黑色的树木有：（　　）

A、火棘

B、女贞

C、小蜡

D、山楂

60、簇生叶树木有：（　　）

A、银杏

B、雪松

C、金钱松

D、马尾松

61、花芽当年分化型的树木有：（　　）

A、木槿

B、槐树

C、紫薇

D、珍珠梅

62、常色叶树有：（　　）

A、紫叶桃

B、紫叶小檗

C、红枫

D、木瓜

63、星散花相的树木有：（　　）

A、珍珠梅

B、鹅掌楸

C、白兰

D、木本绣球

64、枝红色的树木有：（　　）

A、红瑞木

B、杏

C、赤枫

D、野蔷薇

65、世界五大公园树指：（　　）

A、南洋杉

B、巨杉

C、金钱松

D、日本金松

66、依对热量因子的适应能力，园林树木可分为：（　　）

A、热带

B、温带

C、亚热带

D、寒带

67、先花后叶类的园林树木有：（　　）

A、白玉兰

B、广玉兰

C、紫玉兰

D、二乔玉兰

68、叶深绿色的树木有：（　　）

A、油松

B、圆柏

C、女贞

D、桂花

69、覆被花相的树木有：（　　）

A、板栗

B、泡桐

C、栾树

D、马尾松

70、横纹树皮的树木有：（　　）

A、山桃

B、桂花

C、桃

D、樱花

三、判断题（280 题）

1.丛植的植株株数一般不超过 15 株。（　）
2.建筑的入口两侧可栽植凤尾兰。（　）
3.追肥应早施，基肥应巧施。（　）
4.园林树木在保护环境方面的作用首先是净化空气的作用。（　）
5.植物对微量元素的利用很少，一但缺乏，也不会对植物生长造成很大的影响。（ ）
6.文竹多用播种和分株进行繁殖。（　）
7.银杏、桃、苏铁等树种的播种方式以撒播为好。（　）
8.树木随季节气候的变化，而有不同的生命活动现象，称为植物的物候期。（　）
9.在园林空间处理上，开合的对比可形成敞景和聚景。（　）
10.常绿树带泥团起苗，泥团直径是苗木胸径的 3—4 倍。（　）
11.土壤固体颗粒的粒级越大，组成的土壤保肥能力越强。（　）
12.树木修剪是在整形的基础上根据某种目的而施行的。（　）
13.列植就是指乔、灌木按一定直线和曲线成排成行的栽植。（　）
14.屋顶花园宜选择耐荫性植物。（　）
15.石硫合剂具杀虫、杀菌的双重作用。（　）
16.扦插繁殖苗，其根系是利用其不定根而形成，称为“自根苗”。（　）
17.再次侵染是指越冬后的病原物对植物引起的侵染。（　）
18.在布置水生植物时应注意水池的深度以及在水面的比例。（　）
19.中国盆景是通过作品来讴歌祖国壮丽河山，激发爱国、爱家乡的崇高精神。（　）
20.人工控制花期的目的就是使花卉能够提前开花。（　）
21.树木净化空气的作用是因为它的呼吸作用能吸进二氧化碳，放出氧气。（　）
22.根与茎的主要区别就在于根生长在土壤中而茎生长在空气中。（　）
23.带土球苗装运时，高度在 2 米以下的可立放，2 米以上的应斜放。（　）
24.地被植物低矮，用于覆盖黄土，所以都是耐阴植物。（　）
25.三株丛植最大的一株树应稍远离。（　）
26.汀步是在园林中表现为一种小品形式和特殊形式的“路”。（　）
27.学校大门的绿化以建筑为主体，绿化为陪衬。（　）
28.花坛设计的排水坡度一般为 50%左右。（　）
29.对菊花进行辐射诱变时，最适用的部位是脚芽和嫩枝。（　）
30.盆景植物的繁殖方法及对光照、温度、湿度、土壤等要求严格。（　）
31.为提高扦插成活率，应设法使气温高于地温。（　）
32.瓜叶菊是冬春重要的盆花，但它的耐寒性却不强。（　）
33.花坛的特征是具有装饰性。（　）

34.摘去树干上无用的芽称“去箐”。（ ）

35.土温升降快慢的次序为：沙土>壤土>黏土。（ ）

36.花既是宿根花卉，又是常日照花卉。（ ）

37.自身缠绕的攀援植物具有吸盘。（ ）

38.毒饵诱杀害虫是理由昆虫的趋光性。（ ）

39.综合性公园里的动物园宜布置在下风向或河流的下游。（ ）

40.单子叶植物的根系多为须根系。（ ）

41.草坪用草都是禾本科植物。（ ）

42.由于水肥条件的不足而造成的植物矮化变异应属于可遗传变异。（ ）

43.“实生苗”保守性弱，具有完整根系，寿命长。（ ）

44.引起植物产生药害的原因是药剂。（ ）

45.枝的每个节上有两个以上的叶交互着生，叫对生叶序。（ ）

46.适地适树的途径有改地适树、改树适地、适地接树、选择树种。（ ）

47.扦插繁殖苗保守性弱，具有完整根系寿命长。（ ）

48.孤植树可作观赏的主景。（ ）

49.配制乳油，水剂药液、要先加农药，后加稀释剂冲拌均匀。（ ）

50.建筑的北侧宜选用耐荫性植物。（ ）

51.土壤的碱度过大，会引起土壤中矿质元素的沉淀或流失，而不能被植物利用。（ ）

52.蒸腾作用能促进植物根部对水分和矿质的吸收。（ ）

53.仙人掌类植物喜欢在中性偏微碱性的地中生长。（ ）

54.球根花卉的类型有很多，如球茎类的唐菖蒲，鳞茎类的美人蕉。（ ）

55.食叶性害虫用具有胃毒、触杀作用的杀虫剂防治效果较好。（ ）

56.观果树种在年生长周期中的表现是早实性中实性晚实性 （ ）

57.自然式栽植的定点原则：应保持自然，呈等距或排成直线。（ ）

58.在同一张图纸内，相同比例的各图样应选用相同的线宽组。（ ）

59.成虫期是昆虫的生长发育时期。（ ）

60.菊花既是宿根花卉，又是常日照花卉。（ ）

61.屋顶绿化的基础施工包括防水处理和栽植苗木。（ ）

62.苗木在幼苗期吸收能力弱，应勤施薄肥，并以氮肥混合使用。（ ）

63.草木灰只宜在酸性和中性土壤中施用，切忌与氮肥混合使用。（ ）

64.用嫁接方法获得的苗木叫做实生苗。（ ）

65.鸡冠花属于较耐寒花卉，故适宜在秋季播种。（ ）

66.杜鹃、山茶适合在中性偏微碱性土壤中生长。（ ）

67.一串红是国庆节用花的重要材料，通常用播种和扦插进行繁殖。（ ）

68.药剂防治害虫在低龄幼虫期最恰当。（ ）

69.以菌治虫包括利用真菌、细菌、病毒等防治害虫。（ ）

70.复合肥是指同时含有氮、磷、钾三种元素的化学肥料。（ ）

71.重庆市的市树是小叶榕。（ ）

72.嫁接繁殖苗，其根系是利用砧木的根系，称为“他根系”。（ ）

73.间苗的原则是：留优去劣，间密留疏，分布均匀。（ ）

74.用压条方法获得的苗木叫实生苗。（ ）

75.园林植保机械是仅限用于园林生产上防治病虫害的一种机械。（ ）

76.在病虫生长的任何时期施药均可达到同样效果。（ ）

77.客土改良法能改善土壤的结构，促进团粒结构的形成。（ ）

78.在大树移植工程中，大树的定根水应分两次浇灌。（ ）

79.绿化施工的对象是绿色的植物和园林小品建筑。（ ）

80.在植树工程中，地形整理工程应分两次进行。（ ）

81.制作任何一盆山水盆景或树桩分盆景都必须先将材料、植物等准备齐后再制作。（ ）

82.苗木进入生殖生长阶段，应多施磷钾肥。（ ）

83.银杏、苏铁等大粒种子的播种方式以点播为好。（ ）

84.根据栽培方式不同，菊花属于宿根花卉。（ ）

85.大花君子兰的花期一般从11月至翌年四月，该花为优良的盆栽观花叶植物。（ ）

86.引起植物产生要药害的原因就是因植物种类不同造成的。（ ）

87.用农药喷雾防治病虫害，药液的浓度不必按要求稀释，只估计个大概就行。（ ）

88.用喷粉机将粉剂农药直接喷洒在防治对象或植物体上的用药方法就叫喷粉法。（ ）

89.根外追肥的时间最好是在傍晚。（ ）

90.在植树工程中，对珍贵树种和根系发育差的速生树种，不须带土球起苗。（ ）

91.花坛整地质量要求，挖地深翻的深度为20-30厘米，最大土块不小于2厘米。（ ）

92.花坛养护管理要求要四季有花，株行距离、高低层次、色彩搭配适宜。（ ）

93.草坪管理中，要严格控制草的生长，坚持“除草、除小、除了”的原则。（ ）

94.盆景的“三要素”是盆、景、几架三部分，三者间，景起主导地位。（ ）

95.任何一盆树桩盆景可观赏树根、树干、树枝、树叶及花果等。（ ）

96.美人蕉是美人蕉科的多年生草本花卉，耐高温、观赏的是雄蕊瓣化。（ ）

97.中国石竹、霞草、矮雪轮、矮牵牛叶对生，同属石竹科。（ ）

98.菊花、一品红是短日照花卉，它们的生长过程对光照要求不高。（ ）

99.引种实生苗，种子最好采自幼龄植株第一次所结的果实。（ ）

100.选择是育种的基本途径，贯穿于育种工作的第一步骤。（ ）

101.容器育苗只能用于播种。（ ）

102.组织培养就是对植物的器官进行离体培养。（ ）

103.引种地区与原产地区气候因素越接近，引种易获成功。（ ）

104.组织培养只能在固体培养基中进行。（ ）

105.防止良种退化的途径是提高繁殖系数。（ ）

106.植物体的每一个器官都是由许多种不同的组织构建成的。（ ）

107.植物的营养生长达到一定阶段后，分化形成花或花序的过程叫花芽分化。（ ）

108.人工培育的百合品种不能申请植物新品种保护。（ ）

109.短截是将枝条的生长点去除的修剪方法。（ ）

110.喷灌系统一般由水泵、输水管和喷头组成。（ ）

111.盆栽花卉最常用的花盆种类是塑料花盆和瓷盆。（ ）

112.国内切花包装以纸箱为主，箱子的尺寸多为 100 cm 50 cm 30 cm和 120 cm 50 cm 30 cm两种类型。（ ）

113.实生苗比营养繁殖苗更易产生变异，出现新品种。（ ）

114.切花采收的时间最好是傍晚或清晨。（ ）

115.无土栽培中，欲使营养液的 PH 降低，应将水加入酸中。（ ）

117.在园林图纸上植物的平面表示没有统一的规定。（ ）

118.绿色植物不具有过滤噪音的作用。（ ）

119.当图的长度超过图幅长度或内容较多时，图纸可任意加长。（ ）

120.花坛为人们提供了休憩和娱乐的场所。（ ）

121.完工后，反映实际的图叫竣工图。（ ）

122.由真菌引起的病害属于侵杂性病害。（ ）

123.树木施肥可在早春或晚秋进行。（ ）

124.生物防治是一种很有发展前途的防治方法。（ ）

125.球根花卉多数不耐移栽。（ ）

126.叶背与叶表颜色显著不同的树种称双色叶种。 （ ）

127.由 2、3 株至 10、20 株不同种类的树种组合成一个景观单元的配植方式称丛植。（ ）

128.仅在秋季叶子能有显著变化的树称秋色叶树。 （ ）

129.以单株姿态优美的树木植于游人宜注视的透视点(或视轴线)上的一种配植方式称独植。（ ）

130.凡能覆盖地面的植被均称地被植物。 （ ）

131.南树北引的主要限制因子是极限低温，北树南引主要是夏季高温（ ）

132.红树，池杉，枫杨，雪松的耐涝力较强。 （ ）

133.水生植物可以解决水体富营养化。 （ ）

134.城市生态系统表现在食物链的不完全脆弱。 （ ）

135.茎枝生长的决定因子是遗传，茎源根系生长速率低于实生根系。（ ）

136.榉树，香樟，悬铃木的防噪音能力很强。 （ ）

137.我校的悬铃木为“开心果”式的修剪方法，造型美观。（ ）

138.桂花可以做大叶女贞的砧木，而丁香不可以。 （ ）

139.我区香樟叶子黄化，大多数是因为缺少 N 元素。 （ ）

140. 攀缘植物的抗性普遍较强。 （ ）

141.枝条的加长生长主要由于顶端分生组织细胞分裂而成。 （ ）

142.干径可分为胸径地径，对于灌木经常用地径。（ ）

143.地径指地面以上 5`10 厘米树干的直径。 （ ）

144.茎枝的生长速度受遗传因子的作用，可分为速生树种如杨树，慢生树种如银杏。（ ）

145.环境条件影响茎枝的垂直分布差异。 （ ）

146.土壤微生物与高等植物根共生的只有根瘤。（）

147.一般土壤中缺乏根瘤菌，不同植物需要不同的根瘤菌。（）

148.自然界中有许多高等植物与某些真菌共生的根叫菌根。（）

149.有丝分裂是植物细胞分裂最普遍的一种方式.（）

150.无丝分裂在低等植物中普遍存在，其分裂的速度快，能量消耗少。（）

151.大多数高等植物可分为根、茎、叶、花、果实、种子六大器官。（）

152.除了病毒外,所有的生物都是由细胞构成的。（）

153.植物细胞是植物体结构和功能的基本单位。()

154.植物体内营养物质主要是淀粉、蛋白质、脂肪。（）

155.蛋白质是原生质最重要的组成成分。（）

156.生活细胞的原生质中的主要化合物是水。()

157.十字花冠是不整齐花冠。（）

158.漏斗形花冠是整齐花冠。（）

159.梨果是一种假果.（）

160.只由子房直接发育而来的果实叫真果。（）

161.减数分裂后，子细胞的染色体数是 2N。（）

162.木质部能输送水分。（）

163.韧皮部能输送水分。（）

164.芽是枝或花的原始体。()

165.完全叶是由叶片、叶柄和托叶组成的叶。（）

166.茎尖的伸长区在生长季节结束后将不复存在。（）

167.生长在赤道附近的树木,其茎的横切面上找不到年轮。（）

168.有些树的树干中空，但仍生气勃勃，是因为被虫蛀掉的中间部分已成为没有生理功能的多余物。（）

169.叶镶嵌现象是植物为了更多地获取光照而产生的一种适应生态的形式。（）

170.只胡花柄、花托、花萼、花冠、雌蕊、雄蕊六部分都齐全的才叫完全花。（）

171.裸子植物的种子没有子叶。（）

172.单子叶植物的种子都有胚乳。（）

173.种子的胚是由胚芽、胚轴、胚根和子叶构成的。（）

174.土壤肥力的高低，主要取决于养分的多少。（）

175.土壤有机质矿质化过程利于养分的积累。()

176.土壤有质质腐殖化过程有利于养分的释放。（）

177.土壤过滤的形式阻留下来一部分物质进行吸的性能称为土壤的物理吸附作用。（）

178.土壤溶液的浓度随土温的升高而增大。()

179.土壤水分的形态中，膜状水是对植物完全有效水。（）

180.植物的根毛渗透压最大时为 15 个大气压。（）

181.当土壤水分增多、空气减少时，其热容量小。（）

182.深秋时候灌水,有利于提高土温。（）

183.大气相对湿度小时，土壤水分蒸发强,失水多，散热降温快。（）

184.铵态氮肥的铵离子，只能被植物吸收,土壤不吸收，易造成养分的流失。（）

185.含有 N、P、K 三元素中两种以上的化学肥料称复合肥料。（）

186.过磷酸钙和草木灰可以混合使用。（）

187.有机肥料中，C/N 越大，越容易腐熟。（）

188.施用后短期就能见效的肥料，叫速效肥料。（）

189.过磷酸钙是中性肥料，对土壤无不良影响。（）

190.土壤三相比，即指固相、气相、液相的容积百分比。（）

191.有机肥料腐熟过程中，水分越多,腐熟越快。（）

192.保护地土壤的特性之一是土壤中溶液浓度偏高。（）

193.局部受害，病斑与健康组织分界明显，潮湿条件下有“溢脓”现象,是细菌引起的病害。（）

194.整株发病，发病株为单株或病株分散,是生理因素引起的病害。（）

195.整株发病，发病株成片发生,是病毒性病害。（）

196.侵染性病害是由生物因子引起的，能相互传染,有侵染过程。（）

197.桧柏——梨锈病出现许多形式的孢子，其中担孢子危害桧柏，锈孢子危害梨树。（）

198.真菌是具有细胞壁、细胞核，含有叶绿素，能进行有性和无性繁殖的有机体。（）

199.昆虫的足分为基节、转节、腿节、胫节、附节、前附节。（）

200.桃细菌性穿孔病是生理病害。（）

201.桑寄生性种子植物，它没有叶绿素,没有根,有茎，有叶子。（）

202.樱花根癌病是由真菌侵入引起的。（）

203.苗木猝倒病是真菌引起的。（）

204.月季黑斑病，主要危害叶片，感病初期叶片上出现褐色小点。（）

205.高温干燥有利于红蜘蛛的发生。（）

206.粉锈宁主要防治白粉病、锈病，使用浓度一般为 500－800 倍数。（）

207.触杀剂可以杀死初孵活动阶段的介壳虫若虫。（）

208.蚜虫以未受精的成虫越冬。（）

209.防治瓜叶菊白粉病，要合理施肥，氮肥不宜过多，应增施有机肥及磷钾肥。（）

210.园林树木的大多数是中性树。（）

211.叶扁平呈鳞片状的常绿树多阴性树。（）

212.云杉、冷杉、红杉都属于杉科。（）

213.南洋杉可作行道树、园景或纪念树，也可盆栽观赏用。（）

214.大王椰子、假槟榔、散尾葵都是棕榈科植物。（）

215.丝葵树皮具环纹和纵裂纹，叶大，扇形，裂叶多,末端 2 裂，先端下垂。（）

216.香樟是常绿乔木，单叶，薄革质，螺旋状互生。（）

217.银杏有长短枝，叶在长枝上互生，在短枝上簇生。（）

218.含羞草科树种的花左右对称。（）

219.蔷薇亚科中没有单叶植物。（）

220.柏科的鳞形叶全部对生。（）

221.杨柳科植物都是乔木。（）

222.龙船花是常绿小乔木，叶对生，夏季季开花。（）

223.丝兰和凤尾兰是同一种植物。（）

224.蔷薇科共有四种类型的果实。（）

225.芸香科树种都是单身复叶。（）

226.木犀科也有单性花。（）

227.竹类的茎杆圆型，叶子排成两例。（）

228.为避免冻害，芍药常在春季进行分株繁殖。（）

229.四季秋海棠属于球根秋海棠类。（）

230.大花美人蕉是多年生草本植物,茎肉质，无分枝，叶互生。（）

231.在插花时为求得平衡与稳定,常把花朵大的，色深浓的花枝作为主体，放在近中心下方位置。（）

232.花丛花坛在平面上必须栽出各种图案。（）

233.为了发挥花卉群体美的效果，在一个花坛上，花的色彩越多越好,越丰富越好。（）

234.绝大多数温室花卉怕寒冷不怕炎热。（）

235.拌种常在种子细小,粒轻的情况下采用。（）

236.三色堇每朵花上有白、黄、蓝三色。（）

237.仙客来在夏季休眠期应保持土壤干燥。（）

238.米仔兰在夏秋季节要多浇水，否则花会失去香味。（）

239.文竹的叶绿色、纤细、水平展开如羽毛状。（）

240.马蹄莲花白色。（）

241.在配置地被植物时,若乔灌木和地被植物均开化的，则要将花期错开。若同时开花,则色彩必须互相协调。（）

242.温室花卉出棚前，必须对其进行锻炼，在进棚前，要对温室进行消毒和维修。（）

243.组织培养的理论依据是植物细胞的全能性。（）

244.大理花地下部具有根状茎。（）

245.大红花是常绿灌木，分枝红色,叶互生，全年均可开花。（）

246.一品红是大戟科植物,常绿灌木，植物体有乳汁。（）

247.凤凰木是落叶乔木,二回羽状复叶，果为荚果。（）

248.龙眼与荔枝都是无患子科植物，常绿乔木，羽状复叶。（）

249.人面子是漆树科植物，叶集生于枝顶，革质,长圆状披针形。（）

250.桂花、九里香、白兰花、含笑和鸡蛋花属于香花树种。（）

251.大叶榕、木棉、人面子、香樟和芒果等常用作行道树种。（）

252.新草坪的建立，只能通过草籽的播种繁殖来予以完成。（）

253.对植是同一树种、规格相同的树木,左右对称的种植形式。（）

254.月季、夹竹桃、悬铃木等都可作为幼、托机构的绿化植物。（）

255.医院绿化重要的是创造安静的休息和治疗环境，具有卫生防护作用。（）

256.4 株树配置，一般最大与最小搭配,组成 2：2 的形式，这样两组体量上就可以达到均衡.（）

257.群植主要体现群体美，植物一般可分为五个层次，从高大乔木至低矮的草本植物。（）

258.3 株树木配置，一般采用 3 个树种，这样组成的树丛效果好。（）

259.绿篱双行种植成品字形,修剪成梯形、倒梯形、矩形等。（）

260.孤植是指乔木的单株独立种植，在树下可配置灌木。（）

261.密林郁闭度为 40%—70％，疏林郁闭度为 20%—30％。（）

262.混合草坪是指禾本科植物与少量开花鲜艳但不太高的草本植物组成。（）

263.独立花坛的长短轴比例一般不大于 3：1，面积不能太大。（）

264.花镜是规则式构图。（）

265.噪声车间周围采用枝叶迷的树种规则式种植。（）

266.居住区绿地,包括公共绿地、宅旁绿地、配套公用建筑所属绿地和道路绿地等。（）

267.中国园林的雏形称“囿”。（）

268.街道绿化在城市园林绿化中以“面"的形式广泛分布。（）

269.实际长度 1 米，在图纸上为 1 厘米，比例是 1:100。（）

270.单个的独立平面花坛，应由中心向外的顺序退栽。（）

271.一面坡式的花坛应由下向上栽。（）

272.大型花坛应该分区、分块种植。（）

273.两株植物栽植时距离靠近,间距不要大于树冠半径之和。（）

274.行列式栽植可用枝叶稀疏，树冠不整齐的树种。（）

275.花坛周边一般用色彩鲜艳的建筑材料铺砌镶边。（）

276.为了便于行人，林荫道分段和出入口应尽量多些。()

277.工厂绿化要从实际同发,不必强调个别绿化配置的完整性。（）

278.树冠伸展，上部呈半圆形的树冠称为圆形树冠，如香樟、合欢、槐树等。（）

279.根系也是树木的合成器官。（）

280.土壤中含量多的养分根就多吸收，含量少的养分根就少吸收。（）

高校后勤系统园林绿化技能竞赛理论题库答案

一、单选题（350）

1、D 2、B 3、A 4、D 5、D 6、B 7、B 8、D 9、C 10、B 11、B
12、C 13、B 14、B 15、B 16、B 17、A 18、C 20、B 21、D 22、A
23、A 24、A 25、A 26、D 27、D 28、D 29、B 30、A 31、B 32、B
33、A 34、D 35、B 36、C 37、C 38、A 39、D 40、A 41、B 42、C
43、A 44、B 45、C 46、C 47、A 48、D 49、C 50、A 51、D 52、B
53、A 54、D 55、C 56、B 57、D 58、A 59、D 60、C 61、B 62、C
63、B 64、B 65、C 66、D 67、C 68、C 69、C 72、B 73、B 74、A
75、D 76、A 77、D 78、A 79、A 80、C 81、A 82、D 83、C 84、C
85、A 86、A 87、B 88、A 89、C 90、B 91、D 92、B 93、A 94、D
95、B 96、C 97、A 98、D 99、C 100、A 101、C 102、D 103、B
104、C 105、B 106、B 107、C 108、D 109、B 110、D 111、A 112、D
113、A 114、C 115、C 116、B 117、C 118、B 119、D 120、C 121、A
122、B 123、A 124、D 125、D 126、B 127、D 128、D 129、A 130、C
131、D 132、B 133、B 134、C 135、C 136、A 137、B 138、B 139、B
140、C 141、A 142、B 143、C 144、B 145、A 146、B 147、B 148、B
149、D 150、D 151、C 152、C 153、D 154、D 155、A 156、D 157、D
158、A 159、D 160、C 161、A 162、B 163、D 164、B 165、B 166、B
167、A 168、C 169、A 170、C 171、A 172、C 173、D 174、B 175、A
176、D 177、C 178、A 179、D 180、D 181、C 182、A 183、C 184、C
185、C 186、A 187、D 188、B 189、A 190、D 191、D 192、B 193、C
194、D 195、D 196、A 197、D 198、C 199、C 200、D 201、D 202、A
203、B 204、C 205、B 206、A 207、A 208、A 209、D 210、C 211、C
212、A 213、A 214、C 215、B 216、D 217、C 218、B 219、D 220、A
221、B 222、B 223、B 224、C 225、D 226、D 227、D 228、B 229、A
230、D 231、B 232、B 233、A 234、B 235、C 236、C 237、B 238、D
239、C 240、B 241、B 242、D 243、A 244、B 245、C 246、B 247、C
248、C 249、D 250、B 251、D 252、B 253、B 254、C 255、C 256、D

257、A 258、B 259、A 260、C 261、B 262、B 263、D 264、B 265、B
266、C 267、D 268、C 269、A 270、D 271、D 272、B 273、C 274、B
275、A 276、D 277、A 278、D 279、B 280、A 281、D 282、C 283、B
284、B 285、B 286、B 287、D 288、B 289、B 290、C 291、C 292、A
293、D 294、B 295、C 296、D 297、A 298、B 299、C 300、B 301、A
302、B 303、C 304、B 305、D 306、C 307、A 308、A 309、A 310、C
311、A 312、B 313、D 314、B 315、B 316、C 317、B 318、A 319、C
320、C 321、D 322、A 323、C 324、B 325、C 326、D 327、B 328、A
329、B 330、A 331、C 332、D 333、B 334、D 335、B 336、D 337、D
338、B 339、C 340、A 341、C 342、D 343、D 344、C 345、C 346、C
347、B 348、B 349、C 350、A

二、多选题 （70）

1、ABC 2、ABCD 3、ABD 4、ABCD 5、ABCD 6、ABCD 7、ABC 8、ABD
9、ABCD 10、ABD 11、ABD 12、ABC 13、BCD 14、ACD 15、ABD 16、ABD
17、ABCD 18、ABCD 19、ABCD 20、ABCD 21、ABC 22、ABC 23、CD
24、AB 25、ABC 26、AD 27、BCD 28、AB 29、ABCD 30、ABC 31、ABCD
32、ABC 33、ABCD 34、ABC 35、BCD 36、ACD 37、ABC 38、ABD 39、AB
40、ABC 41、BCD 42、ABCD 43、BCD 44、ABCD 45、ABCD 46、ABCD
47、ABCD 48、ABCD 49、ABCD 50、ABCD 51、BCD 52、ABCD 53、ABCD
54、ABCD 55、ABD 56、ABCD 57、ACD 58、ABC 59、BC 60、ABC 61、ABCD
62、ABC 63、ABC 64、ABCD 65、ABCD 66、ABCD 67、ACD 68、ABCD 69、AC
70、ACD

三、判断题答案（280）

1、√ 2、× 3、× 4、√ 5、× 6、√ 7、× 8、√ 9、√ 10、×
11、× 12、√ 13、√ 14、× 15、√ 16、√ 17、× 18、× 19、√
20、× 21、× 22、× 23、√ 24、× 25、× 26、√ 27、√ 28、×
29、√ 30、√ 31、× 32、√ 33、√ 34、× 35、√ 36、× 37、×
38、× 39、√ 40、√ 41、× 42、× 43、√ 44、× 45、× 46、√
47、× 48、√ 49、× 50、√ 51、√ 52、√ 53、√ 54、× 55、√
56、× 57、× 58、√ 59、× 60、× 61、× 62、√ 63、√ 64、×
65、× 66、× 67、√ 68、√ 69、√ 70、× 71、× 72、√ 73、√
74、× 75、× 76、× 77、√ 78、√ 79、× 80、√ 81、× 82、√
83、√ 84、× 85、√ 86、× 87、× 88、√ 89、√ 90、× 91、×

92、√ 93、× 94、√ 95、× 96、√ 97、× 98、× 99、√ 100、×
101、× 102、× 103、√ 104、× 105、× 106、√ 107、√ 108、×
109、× 110、√ 111、× 112、√ 113、√ 114、√ 115、× 117、×
118、× 119、× 120、× 121、√ 122、√ 123、√ 124、√ 125、√
126、√ 127、× 128、√ 129、√ 130、√ 131、√ 132、× 133、√
134、√ 135、× 136、× 137、√ 138、× 139、× 140、√ 141、×
142、√ 143、√ 144、√ 145、√ 146、× 147、√ 148、√ 149、√
150、× 151、√ 152、√ 153、√ 154、√ 155、√ 156、√ 157、×
158、√ 159、√ 160、√ 161、× 162、√ 163、× 164、√ 165、√
166、√ 167、√ 168、× 169、√ 170、× 171、× 172、× 173、√
174、× 175、× 176、× 177、√ 178、√ 179、× 180、√ 181、×
182、× 183、√ 184、× 185、√ 186、× 187、× 188、√ 189、×
190、√ 191、× 192、√ 193、√ 194、× 195、× 196、√ 197、×
198、× 199、√ 200、× 201、× 202、× 203、× 204、√ 205、√
206、× 207、√ 208、× 209、√ 210、× 211、√ 212、× 213、√
214、√ 215、× 216、√ 217、√ 218、× 219、× 220、√ 221、×
222、× 223、× 224、× 225、× 226、√ 227、√ 228、× 229、×
230、√ 231、√ 232、× 233、× 234、× 235、√ 236、× 237、√
238、× 239、× 240、× 241、√ 242、√ 243、√ 244、× 245、√
246、√ 247、√ 248、√ 249、× 250、√ 251、√ 252、× 253、×
254、× 255、√ 256、× 257、√ 258、× 259、× 260、× 261、×
262、× 263、√ 264、× 265、× 266、√ 267、√ 268、× 269、√
270、√ 271、× 272、√ 273、√ 274、× 275、× 276、× 277、√
278、× 279、√ 280、×